

小松菜の栽培



1 年 M. A

小松菜の由来

ツケナ類 (アブラナ科の非結球の総称) の一種

小松菜の特性

- ・ 生育温度 5℃～35℃
- ・ 旬は？ 12月～1月
- ・ 栄養価は？ **ビタミンA**に富み鉄分などのミネラルが豊富でカルシウムの含有量が高い。
- ・ 小松菜を食べると
美味しくない

小松菜の育て方

・ 土づくり 種まき

(11月5日)

ポリポットに鉢底にネットをして
培養土を

400mポリポットに入れる
その後化成肥料を元肥4粒入
れる。

その後中央に深さ 1cm ぐらい穴をあけ種を 3粒 入れる。



・ 間引き (11月26日)

間引きは、していません。

間引きとは、他と比べて小さいもの。変形しているものなどから 3~4cm 間
隔に間引きます。間引きは、病害虫を防ぐ通気性を良くする+栄養分を多
くして収穫量をあげる。

・追肥

追肥は、栄養分を補う。

(12月17日)

(1月14日)

(12月3日)

(12月17日)



・低温対策

小松菜を袋に入れて低温に、
しないようにする。





小松菜を食べよう！



[調理名]

小松菜のおかかマヨ

[材料]

かつおぶしもどき

マヨネーズ

酒

小松菜



[調理した感想・食べてみた感想]

とても簡単だった。

あまりおいしくなかった。

肥料有り と 肥料無しの比較



観察日	肥料有り	肥料無し	作業内容
11 月 5 日			土づくり 種 まき
11 月 26 日			観察 + 追肥
12 月 3 日			観察 + 追肥
12 月 10 日			観察 + 追肥

観察日	肥料有り	肥料無し	作業内容
12月17日			観察＋追肥
1月14日			観察＋追肥
1月21日			観察＋追肥
1月28日			観察＋追肥

あなたの収穫量

0 g / 株

学級の収穫量平均



9.96 g / 株

肥料無しの収穫量

6.18 g / 株

栽培期間中の平均気温の変化

温度は、変化あり。12月10日から1月20日まで、小松菜の生育温度の5℃を下回ることがあった。そのため低温対策をした。



肥料の効果の考察

①・写真を比較しての考察

肥料なしは葉が一部黄色になっていた。

肥料ありは、何もなっていなかった。

②収穫量を比較しての考察

僕の小松菜は、芽が出ず 0g でした。

学年平均約 10g でした。

肥料なしでは、約 6g で学年平均の 10g より 4g 少なかったなので、肥料があったほうがよかったです。

○分かったこと・まとめ

- ・肥料ありのほうが肥料なしより育った。肥料ありは、黄色くならず肥料なしは、黄色くなった。

小松菜の栽培を通して分かったこと

小松菜の栽培は温度調節難しかったが、調理はかんたんだった。小松菜の
成育温度は、育てやすい。温度だった。

