

学校感染症出席停止の基準

分類	病名	出席停止の基準	
第1種	エボラ出血熱, クリミア・コンゴ出血熱, 痘そう, 南米出血熱, ペスト, マールブルグ病, ラッサ熱, ジフテリア, 重症急性呼吸器症候群(SARS), 急性灰白髄炎(ポリオ), 鳥インフルエンザ(H5N1), 新型コロナウイルス感染症	治癒するまで	
第2種	インフルエンザ	発症した後5日を経過し, かつ, 解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで	
	百日咳	特有の咳が消失するまで, または, 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで	
	麻疹(はしか)	解熱した後3日を経過するまで	
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	耳下腺, 顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し, かつ, 全身状態が良好となるまで	
	風しん(三日はしか)	発疹が消失するまで	
	水痘(みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮化(かさぶたになる)するまで	
	咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消退した後2日を経過するまで	
	結核 髄膜炎 菌性髄膜炎	症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで	
第3種	コレラ	症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで	
	細菌性赤痢		
	腸管出血性大腸菌感染症		
	腸チフス		
	パラチフス		
	流行性角結膜炎		
	急性出血性結膜炎		
	その他の感染症	溶連菌感染症	適正な抗菌剤治療開始後 24 時間を経て全身状態が良ければ登校可能
		ウイルス性肝炎	A型・E型: 肝機能正常化後登校可能 B型・C型: 出席停止不要
		手足口病	発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止, 治癒期は全身状態が改善すれば登校可
		伝染性紅斑(りんご病)	発疹(顔面・頬部の蝶形紅斑, 手足のレース状皮疹)のみで全身状態が良ければ登校可
		ヘルパンギーナ	発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止, 治癒期は全身状態が改善すれば登校可
		マイコプラズマ感染症	急性期は出席停止, 全身状態が良ければ登校可能
		感染性胃腸炎 (流行性嘔吐下痢症)	ノロウイルスが原因と診断の場合, 10名以上集団発生の場合のみ。下痢・嘔吐症状が軽快し, 全身状態が改善されれば登校可能
		アタマジラミ	出席可能(タオル, 櫛, ブラシの共用は避ける)
伝染性軟属腫(水いぼ)		出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける)	
伝染性膿痂疹(とびひ)		出席可能(プール, 入浴は避ける)	